



Str. Av. Popisteanu nr.46, sect. 1, Bucuresti Tel. 224.45.96 /fax.224.20.61 e-mail: [ilfovdsp@yahoo.com](mailto:ilfovdsp@yahoo.com)

## DSP ILFOV VA INFORMEAZA:

### INFECTIA CU VIRUSUL WEST NILE



***Infectia cu Virusul West Nile se transmite cel mai adesea prin intepatura de tantari.***

**METODE DE PREVENIRE A INFECTIEI:** evitarea intepaturilor de tantar.

- cand se desfasoara activitati in mediul extern, se recomanda utilizarea unui repelent pentru insecte (solutii contra insectelor sub forma de crema sau spray care se aplica pe suprafata corpului).
- utilizarea unei solutii anti-tantari aplicata pe tegument si purtarea de haine lungi, care sa acopere corpul intr-o proportie cat mai mare, in perioada de activitate maxima a tantarilor, adica intre apusul soarelui si zorii zilei, utilizarea de aparate sau lampi contra tantarilor.
- evitarea patrunderii tantarilor in casa prin montarea de plase speciale la ferestre si evitarea zonelor impadurite sau mlastinoase, desecarea baltirilor de apa din jurul gospodariilor, indepartarea recipientelor de apa statuta.

**PERIOADA DE INCUBATIE:** 3-14 zile

**SIMPTOME:** Aproximativ 80% adica 4 din 5 persoane infectate cu virusul nu prezinta niciun simptom.

- **MODERATE** : Aproximativ 19,4% dintre persoanele infectate cu virusul West Nile prezinta simptome de severitate moderata cum ar fi:

- febra;
- durere de cap;
- simptome gastrointestinale: stare de greata si varsaturi, lipsa apetitului alimentar, diaree;
- dureri musculare si articulare;

- rareori limfadenopatie – inflamarea si marirea in volum a ganglionilor limfatici;
- urticarie la nivelul pieptului, stomacului sau spatelui;
- **SEVERE DE MENINGITA/ ENCEFALITA:** Aproximativ 1 din 150 adica 0,6% din persoanele infectate cu virusul West Nile dezvolta simptome severe de boala care se manifesta prin:
  - febra puternica;
  - dureri de cap;
  - rigiditate la nivelul gatului;
  - stupoare;
  - dezorientare;
  - coma;
  - tremor si convulsii;
  - slabiciune musculara;
  - pierderea vederii;
  - amorteala si paralizie;

Simptomele pot persista pe perioada mai multor saptamani, iar efectele neurologice pot fi permanente.

Recuperarea este caracterizata de o perioada lunga de convalescenta si extenuare.

Simptomele moderate si severe apar la persoanele varstnice ce prezinta si alte boli asociate (boli cardiace, pulmonare sau renale) si la persoanele cu sistem imunitar deficitar.

**TRATAMENT:** Nu exista un tratament specific pentru virusul West Nile ci numai simptomatic.

In cazul manifestarii de simptome de severitate medie, starea pacientului se imbunatateste dupa cateva zile in absenta unui tratament.

In cazul simptomelor severe, se recomanda prezentarea de urgenta la camera de garda.